

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE VOOR ARTSEN EN HULPVERLENERS

Deze patiënt gebruikt natriumoxybaat als behandeling voor narcolepsie met kataplexie.

Natriumoxybaat kan ademhalings- en CZS-depressie, epileptische aanvallen, psychotische gebeurtenissen, depressie en suïcidaliteit veroorzaken.

Alcohol mag niet gebruikt worden tijdens de behandeling met natriumoxybaat.

Opioiden en barbituraten mogen niet gelijktijdig met natriumoxybaat worden gebruikt. Het gebruik van andere ademhalings- en CZS- onderdrukkende middelen moet worden vermeden. Wees extra voorzichtig met het gebruik van topiramaat en valproaat gelijktijdig met natriumoxybaat.

Natriumoxybaat kan misbruik/oneigenlijk gebruik/ afhankelijkheid veroorzaken.

Raadpleeg de samenvatting van de productkenmerken van natriumoxybaat voordat u deze patiënt andere geneesmiddelen voorschrijft of verstrekt.

Datum waarop natriumoxybaat voor het eerst is voorgeschreven:

CONTACTINFORMATIE

Naam van patiënt

.....

Telefoonnummer van patiënt

.....

Naam van naast familielid

.....

Naam van behandelend arts

.....

Telefoonnummer van behandelend arts

.....

Telefoonnummer bij medische nood

.....

NATRIUMOXYBAAT

BELANGRIJKE VEILIGHEIDS- INFORMATIE

Aanvullende informatie betreffende natriumoxybaat is beschikbaar in de samenvatting van productkenmerken (SmPC) en bijsluiter op <http://www.cbq-meb.nl>

U kunt extra materiaal opvragen bij UCB Pharma B.V.
Telefoon 08003434335;
UCBCares.nl@ucb.com

BELANGRIJKE VEILIGHEIDS-INFORMATIE VOOR PATIËNTEN

DOEN

- Zoek direct medische hulp na een te hoge inname van natriumoxybaat
- Draag deze kaart altijd bij u
- Laat de kaart zien aan elke arts of hulpverlener die bij uw behandeling betrokken is
- Neem bij een bezoek aan uw arts of hulpverlener een lijst mee van alle medicatie die u gebruikt
- Als u ongewone symptomen ervaart tijdens het gebruik van natriumoxybaat, zoals gewelddadige gedachten waaronder gedachten om anderen pijn te doen, informeer dan onmiddellijk uw arts
- Bewaar natriumoxybaat buiten bereik van kinderen
- Lees de bijsluiter voor meer informatie over uw medicijn. Ga met vragen over uw medicijn of bijwerkingen naar uw arts of apotheker.

Natriumoxybaat kan de ademhaling onderdrukken en het bewustzijn verlagen.

NIET DOEN

- Gebruik **GEEN** alcohol terwijl u wordt behandeld met natriumoxybaat
- Gebruik **NIET** meer dan de dosis die uw arts heeft voorgeschreven
- U mag **NIET** autorijden of machines bedienen binnen 6 uur nadat u natriumoxybaat hebt gebruikt
- Gebruik **GEEN** andere medicijnen, tenzij u dit met uw arts hebt besproken
- U mag natriumoxybaat **NIET** met anderen delen

Natriumoxybaat
patiënten
waarschuwingskaart
NL-N-XR-NAR-
2100002

Deze materialen beschrijven aanbevelingen om belangrijke risico's van het geneesmiddel te beperken of te voorkomen en zijn beoordeeld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).