

ZILUCOPLAN ▲

PATIËNTENKAART

- Meningokokkeninfecties kunnen snel levensbedreigend worden en kunnen fataal zijn als ze niet snel worden gediagnosticeerd en behandeld.

- Evalueer de patiënt onmiddellijk. In geval van een vermoede meningokokkeninfectie dienen passende maatregelen te worden genomen, zoals behandeling met antibiotica en stopzetting van de behandeling met zilucoplan tot een meningokokkeninfectie kan worden uitgesloten.

- Neem bij een vermoede meningokokkeninfectie bij deze patiënt zo snel mogelijk contact op met de arts die zilucoplan heeft voorgeschreven. De voorschrijver staat vermeld op deze informatiekaart voor de patiënt.

Belangrijke veiligheidsinformatie

voor beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg

Aan deze patiënt is zilucoplan voorgeschreven, een complementcomponent 5 (C5) -remmer die de patiënt vatbaarder kan maken voor meningokokkeninfecties veroorzaakt door *Neisseria meningitidis*.

Zie de SmPC voor meer informatie over zilucoplan.

Naam van de patiënt _____

Identificatienummer patiënt

UCB-ZIL-NL- _____

Naam van de voorschrijver _____

Telefoonnummer voorschrijver _____

Telefoonnummer voor noodgevallen: _____

Bel je arts of zoek direct dringende hulp als je deze tekenen en klachten van meningokokkeninfectie hebt:

- Hoofdpijn met een van deze andere klachten:
 - misselijkheid of braken – stijve nek – stijve rug – koorts
- Koorts met of zonder huiduitslag
- Gevoeligheid van uw ogen voor licht
- Verwardheid of slaperigheid
- Spierpijn met griepachtige klachten

Wil je meer informatie over je medicijn? Lees de bijsluiter of scan de QR-code voor het online materiaal. Ga met vragen over je medicijn of bijwerkingen naar je arts of apotheker



PATIËNTENKAART

▼ Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring.

Laat deze PATIËNTENKAART zien aan iedere arts of hulpverlener die jou onderzoekt en als je naar het ziekenhuis gaat.

Draag deze kaart altijd bij je tijdens de behandeling en gedurende twee maanden na je laatste dosis zilucoplan. Het risico op een meningokokkeninfectie kan tot enkele weken na de laatste dosis zilucoplan aanhouden.

Zilucoplan kan je kans op het krijgen van een meningokokkeninfectie vergroten. Dit kan een infectie zijn van het hersenvlies en het ruggenmerg, dat heet meningitis, of een ernstige infectie van het bloed (sepsis of bloedvergiftiging). Deze infecties kunnen snel levensbedreigend of dodelijk worden als ze niet vroeg worden herkend en behandeld.